

MAGEN  
DAVID  
ADOM  
IN ISRAEL



מגן דוד  
אדום  
בישראל

---

# עילפון Syncope

---







- עילפון הינו תופעה קלינית שכיחה וכמעט יום-יומית בעבור הצוותים המטפלים בכל שכבות הגילאים של המטופלים
- זיהוי מהיר, טיפול וחיפוש הסיבה או הגורם לעילפון הם אלו שיצילו את חייו של המטופל



עילפון הינו איבוד הכרה זמני הנגרם עקב הפרעה באספקת דם/ חמצן למוח שלאחריו המטופל מתאושש באופן ספונטני

גורמים המשפעים על לחץ הדם:

- נפח הדם
- טונוס/ מתח כלי הדם
- תפוקת הלב = נפח פעימה X מספר פעימות בדקה





גורמים שאינם לבביים	גורמים ממקור לבבי
מתח נפשי, לחץ	גירוי וגאלי
שינוי תנוחה פתאומי	הפרעות בקצב הלב
כאב עז	מחלות מסתמים
היפוגליקמיה	אוטם בשריר הלב
הרעלת אלכוהול/סמים	תסחיף ריאתי





# סימנים וסימפטומים

- הפרעות בשמיעה ובראייה
- לחץ דם נמוך
- "שחור בעיניים"
- חיוורון והזעה
- חולשה
- דופק מהיר (טכיקרדיה)
- כאבי ראש וסחרחורות
- נשימה מהירה (טכיפניאה)
- בחילות והקאות
- בלבול




- פגיעה בנתיב האוויר
- טראומה משנית לנפילה
- אספירציה
- חוסר הכרה





- השכבת המטופל והרמת הרגליו ב- 30 מעלות
- תמיכה ב- ABC, מתן חמצן במסכה במידת הצורך
- חיפוש סיבה/ גורם לעילפון
- בדיקת סוכר על מנת לשלול היפוגליקמיה
- לאחר התאוששות המטופל יש להקימו בהדרגה
- בשום אופן, אין להתיז מים או לסטור למטופל!
- בחשד לטראומה, יש לטפל עפ"י סכמת ה- PHTLS
- כל עוד המטופל מחוסר הכרה יש לפעול עפ"י סכמת ההחייאה

## גישה למטופל עם שינוי במצב ההכרה



### דגשים

#### הערכה כללית ראשונית:

- בצע הערכת הזירה.
- זהה וטפל מיידית במצבי חרום מסכני חיים.
- הערך צורך בחבירה עם צוות ALS.

#### הגנה על נתיב אוויר:

- שקול צורך בביצוע שאיבת הפרשות מחלל הפה.
- שקול צורך בהחדרת מנתב אוויר פלסטי.

#### סיוע נשימתי:


- תן חמצן במסיכה בקצב של 10-15 ליטר/דקה לכל מטופל טכיפניאי (מעל 20 נשימות בדקה) ו/או המצוי במצוקה נשימתית (מאמץ נשימתי, שימוש בשרירי עזר, רטרקציות).
- תן סיוע נשימתי (הנשמה באמצעות מפוח המחובר לחמצן) לכל מטופל אפניאי/ברדיפניאי (מתחת ל 8 נשימות בדקה).

#### היפוגליקמיה:

- חשד - חולה סוכרת המטופל תרופתית (כדורים, אינסולין).
- אבחנה - ערך סוכר בדם נמוך מ 60 מג'/%.
- טיפול - שפופרת גלוקוג'ל בהלפה לחלל הפה או במריחה על החניכיים/מתחת לשון (כתלות במצב ההכרה של המטופל).
- ניתן לחזור על מנה נוספת כעבור 10 דק' (במידה ולא חל שיפור קליני/עליה בערכי הסוכר בדם).



# שאלות?



זה עניין של חיים